

## Kinesiologisches Austesten von Covid-19-Impfstoffen für zusätzliche Sicherheit

1. Vortests und eventuelle Korrekturen am Patienten
2. Impfstoff kommentarlos an den 4 Testpunkten testen
  - Nacken / C1 (Toleranzpunkt)
  - Thymus
  - Hara
  - LWS Rücken
3. Fragen mit Impfstoff vor dem Thymuspunkt oder frei in der Hand des Patienten durchführen.
  - Ist das der beste Impfstoff für mich, der zur Zeit am Markt ist? (J / N)
  - Schützt mich dieser Impfstoff vor der Weitergabe der Krankheit? (J / N; eventuell zu x%)
  - Welche Nebenwirkungen können auftreten? (Art der Nebenwirkung – leicht / mittel / schwer – wie lange?)
  - Ist die empfohlene Menge an Impfstoff pro Dosis optimal für mich? (J / N) Wenn nein, was ist die optimale Dosis (+/- Menge)
  - Wie viele Dosen an Impfstoff brauche ich, um einen optimalen Schutz gegen die Krankheit aufzubauen? (1, 2 oder 3)
  - Welches ist der optimale Abstand zwischen mehreren Impfdosen? (Tage) Ist der empfohlene Abstand optimal für mich? (J / N)
  - Wie lange dauert es nach der letzten Impfdosis, bis sich mein Schutz vollständig aufgebaut hat? (Tage / Wochen)
  - Wie gut schützt mich der Impfstoff vor schweren Verläufen der Krankheit? (x%)
  - Wie gut schützt mich der Impfstoff vor leichten Verläufen der Krankheit? (x%)
  - Wie lange hält der Impfschutz an? (x Jahre)
  - Kann ich mit der Kombination von mehreren Impfstoffen eine bessere Wirkung erzielen? (J / N) Wenn ja mit welcher Kombination? (Impfstoffe nennen, die am Körper des Patienten zuvor getestet worden sein müssen) Wenn ja, Wiederholung der Tests mit dem anderen Impfstoff